

乳哺安由接生耶、但初生擾亂、神質未定之際、姑少待之爲得耳、儻或生子稟弱質薄、且遇大寒大熱之時、則尤當不可遲疑也、否則不任時氣酷烈、反致生氣頓衰、不可挽回者亦有矣、余在長崎時、季夏得一女子、生至二日、乳忽不下、余作穢毒、猶阻滯乳、煮葱白卽灌之、因嘔粘涎極多、乳遂得下矣、後隔兩日忽又不下、且見神色頓衰、氣息無幾、因意此必非前日之由、乃稟氣怯弱不任時氣蒸熱、傷元氣而或然也、遂濃煮獨參渣、乃絹裹作小包、仍蘸本汁、徐々絞入兒口、則時有涓滴落咽矣、如此半晌始見舌有轉撥之狀、余於是乎喜出望外、乃敕乳母將乳就口微絞、則亦時自嚥矣、由是或乳或藥、遞用不輟、乃見神氣漸發、生色漸回、飲乳復如故、而獲甦矣、又有一婦、曾產二子矣、生後不出七朝、無故皆發病死、及孕第三子、余乃教之曰、兒生一臍、勿與爾乳、必別尋無病婦人有孕者、則飲之、彼如其言、兒果獲全、爾來有生子不育、每用此法、活者甚衆、蓋新產之際、乳性悍烈、初生軟弱、不能剋化、因發暴病致夭折歟、又有一兒、生至七八日、大腑不通、因致滿氣、促乳不下、膈勢甚危劇、余因急取備急圖、酒解半粒、直灌之、大腑一通、諸證雀然、是以初生孩穉、調理得法、自可保全者、若惟攻擊是務、其不速禍者鮮矣、可不慎哉、見附胎說錄

〔醫學天正記坤〕小兒

一御國様、四歳、肺疳、潮熱、揉目鼻、眼中青額角、鼻上有青紋、齒黑斷出、赤泡多、地骨皮散、六參此令守甘胡黃連丸、方鑑有

〔安齋隨筆〕クロモジノ木、皮ヲサリ、木ヲ刻ミ、煎服スレバ、積痞ヲ治ス、又小兒ノ疳疾、婦人頭痛ヲ治スト云、妙也ト云、用テ驗ヲ試ムベシ、

〔寛永系譜三百九十五〕吉田 宇多天皇十代の孫、佐々木吉田六郎嚴秀九代の後胤なり。
德春○註 略
宗林○註 略
宗忠 淨林○申
宗桂 意安
友佐