

一多斤朧荅各半匁

〔醫學天正記乾下〕產後

一若宮様之御袋後准后。產後血量不^止。小腹在塊而痛、脈浮數而有力乎。紅斤芎沒桃莪之類用先黑藥ヲ用テ血暈止、續テ煎藥三四貼ニシテ瘀血下テ腹痛止。

〔牛山方考中〕一產後蓐勞トナラント欲シ、不食シ漸柴瘦スル者、倭俗血ノ道煩ト云、酒柴胡、酒芍藥、莎艸、砂仁各等分ヲ加ヘ、益母草ノ黒燒一倍、鹿兒シカノハラコモリ黑燒半ヲ加テ、細末シテ煉蜜ニ和シ、煉藥トナシテ服之。鹿兒ノ黒燒可ナリ、產後百病ヲ治ルコト如神、是予ガ家傳ノ方濟陰丹ト名付ク、熟地黃ヲ加ヘ有効、心胸痞シ不食スル者ニハ加ヘズ、眩暈ニハ天麻陳皮ヲ加ヘ、不食ニハ石菖蒲ヲ加、氣弱キ者ニハ人參白朮ヲ加フ。

〔醫略抄〕治產難方

病源論云、產難者、凡有數種、或先漏胞去、血子藏干燥、或子宮宿挾疾病、或觸犯禁忌、或產時未至、便即驚動、穢露早下、子道干澀、婦力瘦弱、皆令產難、凡腹痛腰未痛者未產、腹腰連痛者卽產也。

產經云、產難時、皆開門戶窓、瓷瓶釜一切有蓋之類大効。

〔子玄子產論〕或問男女之辨、余答曰、不知也、問左男右女之說、曰非是也、凡孕皆當任而居中、爲物所壓、則左右側、其右者兒之頭居焉、左者兒之下身居焉、妊娠禁伸脚而寢者、其意蓋恐其臥肆體、則產致橫產也、然檢漢人古醫籍並亡是說、而雖本邦古名醫亦未聞有此議、則知此言徒出近時兒女之臆見者、而偶然傳承、遂成是陋習者耳、不然其言之害事理者亦莫甚焉、何者、凡孕胎必當任而居中、而今屈脚而寢、則肚體必曲撓內縮、此爲其胎難居中矣、且如本邦婦人、又加之以鎮帶束其上、是制其上而戾其下也、胎欲不欹斜、豈可得乎哉、故今孕婦之動致橫產者、率皆夫二者之胎禍、識者不可不力教辨正也、