

汗下吐三法、各有經絡脈理、亦有不當汗不當下不當吐者、汗與下吐之則死、惟從正用之最精、號張子和汗下吐法、妄庸淺術、習其方劑、不知察脈原病、往々殺人、此庸醫所以失其傳之過也、其所著見行于世、有六門二法之目、

〔醫心方〕治病大體第一〇 中

略

又○經針云大法春宜吐、凡諸病在胃中者宜吐之、凡服湯吐中病便止不必盡劑須吐者、虛及傷寒、胃中滿及積、淡乾嘔、又胃隔淡熱轉嗽、及肺癰吐膿等並宜吐之、凡宿食在胃管當吐下之、又云、諸四逆者不可吐之、凡諸虛羸者不可吐之、凡新產者不可吐之、凡脚氣上衝心者不宜吐之、凡病者惡寒而不欲近衣不可吐之、又云、大法秋宜下、凡服湯下中病便止不可盡劑、凡病發作汗多急下之、凡病五日六日腹滿不大便急下之、凡大下後六七日不大便煩不解腹痛而滿此有瘞屎所以然者、本有宿食宜蒸氣湯下之方在、凡病者小便不利大便乍難乍易時有微熱、脾胃不能臥此有瘞屎故也、宜下之、凡可下者湯勝丸、脇下偏痛發熱此寒也、當以溫藥下其寒脇須下、凡諸病大便澀、諸傷寒腹滿、瘧腹滿、鼓脹水脹大便不通須利小便者黃病水病淋病發汗後不解腹滿或痛宜下之、

〔花園院御記〕正中二年三月三日癸丑今日親王略中有腹痛、五月十六日乙丑今日有醫師評定、長直全成、尙忠、仲成等各申議前右府覺圓僧正候御前此僧正殊有醫骨之故也可進寫藥之由一同又御灸事同申之、然而先下痢後可有灸之由治定了、

〔叢桂亭醫事小言〕醫學○中

山脇洋東ノ門人ニ永富鳳介ト云人出テ赤馬關獨嘯庵ト號ス、京師ノ俚言ニ人心ノ儘ニ任せズ、モトレル人ヲ廣ク指テ、毒性ト呼ブ、蓋其唱ノ同ジキヲ以テ、如此ハ號セリヤ、此人越前ニテ、奥村良筑ト云人ニ從テ、吐流ヲ受テ上京シ、東洋先生ニ語レバ、先生大ニ嘉シ、嫡子東門先生ヲ遙ニ越前ヘ下シ、吐方ヲ學バシム、良筑教テ曰、吾子コソ可吐證候具セリト云ヨリ、徒ニ上京シテ、東洋先