

論云、久瘡膿潰不止、故謂之瘻。內經陷脈爲瘻、惡連肉腠、卽此病也。得之諸瘡不差、毒氣流注經絡、及針艾妄施、或用刀傷折、皆能傷脈、故脈陷而氣漏、是以頸領四肢及腰脊脅脈有所傷、皆致此病。惟肌肉實處、治之易愈、生於虛處、則難平也。若遲留歲月、或爲漏骨疽及偏枯之病、蓋榮衛環周不息、脈有所陷不行、必內侵於骨髓而爲疽、血氣漏於一偏、久而虧涸亦或偏枯也。

〔一本堂行餘醫言六下〕瘻郎豆切、音漏

瘻卽瘰癧也。古端云、瘻、又稱瘰癧。後世多不言瘻、唯稱瘰癧。但瘻者已潰之名、而瘰癧者、未潰之稱、又呼其始小者爲結核、雖同一疾所見異狀、故稱謂隨別、而究之其實則一也。只有久近大小、潰不潰之異耳。夫瘻之爲病也、頸邊始結核、或左或右、或左右俱生、上及耳後、下延缺盆、前至頤、後亘項、按之粒粒可知、其小者如大豆、如銀杏、大者如桃栗、大小圓扁、縱橫不齊、或二三或五六、或十餘顆、累々相連疊、歷々可斥數。○下

〔有林福田方十〕瘰癧、クヒコ

論云、夫瘰癧ハ卽九漏是也。多ク項腋ノ間ニアリ、累々トシテ大小定ナシ、發汗寒熱ヲナシ、膿水潰漏ツブレモリ、其根ハ臟腑ニアリ、必用方云、毒藥ヲ以テ點蝕シ、及び針刀ヲ以テ鏹割キリサヒ、療ヲ勞シテ甚クナスコトヲ忌ムベシ、卽ニ蝕バミ入ツレバ后ニ死セズト云物ナシ、蓋シ外醫既ニ慈悲少ナク、又利ユト積日ニヲヒテス、特ニ宜戒之。

〔榮花物語三十九〕右大との家俊かれさせ給事、月日にそへてまさるべし、右大殿年比るといふ物ありけるが、亂給ていみじうわづらひ給ひてうせ給ぬ。

〔令義解二〕凡略中久漏。謂身成乳穴、膿汁潰漏、久而不止、故曰久漏也、漏或作瘻也。

〔續修東大寺正倉院文書二十五〕大寶二年十一月、御野國山方郡戸籍、

中政戸他田赤人戸口廿三○中