

狗兒

下中戶主赤人○
略中

戶主甥廣麻呂○
久漏、中

〔一本堂行餘醫言六上〕微毒瘡徽誤杯音故附下瘡便毒膿淋囊瘡結毒發漏○
略中

疽癰癰。

景岳全書引醫林集要云、又有結核在項腋兩乳傍、或兩股軀肉處、名曰疽癰癰、今考集要、結核作癰腫而無二或字、在癰疽門通治中仙方、解毒生肌定痛散方後、則似亦不可明爲夾脰類也、由張介賓易結核字、則似亦今時俗呼狗兒者也、當時脚有灸瘡腫痛、或足指趺踝、有瘡瘍金創打撲腫痛者、必在腿根近小腹之處結核、腫甚者惡寒發熱國俗呼爲狗兒、又云猪兒、又肩背有灸瘡腫痛、則兩股下必生瘡根熱痛、亦猶小腹腿股合縫結生羊核、王璽所謂腋生夾脰者、即是此也、出醫林集要病源候論云瘡建者亦同

雁瘡

〔傷科秘錄五〕
〔下〕
〔雁瘡〕

臍瘡本邦ニテハ已ニス。子クサト稱シ、多クハ臍ニ發スル瘡ニ、臍瘡ト名ケタルナリ、又雁ノ來ル頃ヨリ發シテ、雁ノ歸ル頃ニハ自カラ愈ルユエ、雁瘡トモ雁來瘡トモ云フ、此病因ヲ考ルニ乃瘀血ナリ、

〔牛山活套〕
〔下〕
〔臍瘡〕

臍瘡ハ、和俗ニハヤキ瘡ト云ヒ、又雁瘡ト云、毎年八九月ヨリ發リテ、二三月ニ愈ルヲ以テ、雁ノ來來ニ因テ名付ル也、愈カヌル者也、此瘡ヲ治セント思ハ、三年ホドカレバ、根ヲ切ル者ナリ、
〔一本堂行餘醫言六下〕
〔臍瘡〕
離音廉切

臍瘡者、謂脚脛生瘡、多痒少痛、搔破出血汁、膿水淋漓、經年不愈、偶愈復發、不可根治也、或有乾燥皮厚皮肉紫黑者、此證頑固、數年不瘥、陷成結毒者間有之、若用外敷藥速愈方、或浴冷泉如珊瑚州多田是也求速