

ノ多キ故、微瘡モ從テ多シ、是自然ノ勢ナリ、サレバ此病ヲ患ル者ハ、必ず傳染ニテ自發スルコトナシ、平生純樸ニテ花街柳巷ニ決シテ遊ブコトノナキ者、及ビ老人小兒ノ患ルナドハ、如何ニモ自發ノ様ナレドモ、コレ又必ず傳染スル因縁有モノナリ、或ハソノ夫謹慤ナリトイヘドモ、ソノ妻外ヨリ微瘡ノ氣ヲ受テ、夫ニ傳フルコトアリ、或ハ逆旅ノ寢衾ヨリモ傳ヘ、或ハ鑄工ノ剃刀ヨリ傳ヘ、甚ハ一時煙管ヲカリテ用モ、マタソノ毒ニ傳染スルコトアリ、小兒ノ患フルハ、微婦ノ乳ヲ哺セシメテ受ルト、父母ノ遺毒トナリ、老人ト幼童ノモノトハ、微氣ヲ内ニ畜ヘタル婦婦ナドニ姦通スルヨリ傳ルモノ多シ、十二三歳ノ童男童女ノ病ミタルモ、六七十歳ノ老翁老媪ノ患タルモ、療治セリ、凡ソ微毒ノ傳染不可思議ナルコト此ノ如クナレバ、丁寧反覆シテ因縁ヲ詳ニ問フベシ、

〔微瘡新書〕微瘡論

微瘡之病、攷華人所論、昉自嶺南卑濕地、而蔓延四方、如本邦亦起、從肥前州、而播布通國云、蓋此病稀於古時、而盛于後世、故其治法、亦龕於前、而審于後、然而呼稱百出、濫名頗多、或隨形狀之近似者、而名焉、或取始所起地、而命焉、或因其所發之處、而稱焉、或依字音假借會意、以擴其名呼矣、如其曰微瘡、曰梅瘡、曰賣瘡、曰瘡子、曰楊梅瘡、曰楊梅微瘡、曰楊梅毒瘡、曰楊梅風、曰楊梅疳、曰綿花瘡、曰砂仁瘡、曰茱萸瘡、曰果子瘡、曰天泡瘡、曰濕陰瘡、曰妬精瘡、曰陰蝕瘡、曰廣瘡、曰廣東瘡、曰廣痘、曰廣豆、曰恥瘡、曰臊疳、曰濕毒、曰濕氣、曰陰疔、曰陰頭癰、曰陰頭瘡、曰蠟燭發、曰下疳、曰便毒、曰魚口、曰魚口瘡、曰橫痃、曰橫眼、曰疔瘡、曰蛙梗、曰蛙疔瘡、曰蛙幹疔瘡、曰卷心蛙疔瘡、曰獨脚楊梅瘡、曰時瘡、曰血疔、曰血疔、曰外仙、曰結毒、曰氣毒、曰痰癩、曰下疔瘡、曰路岐、曰瘰癧、曰瘰癧、曰露痕、曰駢馬癰、曰駢馬癰、曰駢馬墜之類、不暇枚舉、殆誣惑後人之耳目也、以余觀之、唯微瘡、下疔、便毒、結毒之四名、以蔽之矣、而此病近世尤盛、而貴賤男女罹之者十居其半、是誠和華一轍、蓋承平二百年之久、人々樂安佚、內則膏粱膩味、常滿口腹、遂