

膿淋

〔一本堂行餘醫言 六上〕膿淋

膿淋世總稱淋疾、非也。審視當時患濃淋者、皆是下疳瘡也。蓋下疳者、陰莖外面、生瘡而疳蝕、故人皆易知膿淋者、陰莖瘡中、生瘡潰爛、出膿及血、疼痛淋瀝、幾似淋疾、實非真淋疾、故人不得知耳、其辨詳在癰條、且熱溺、掠拂瘡內、瘡爛處出來、則瘡中自不得不刺痛、此其所以疼痛滴瀝、與真淋疾不異也。方其溺道、瘡口、溜膿貼視之時、或睡中若不虞裏、揭起裊去、而其陰頭粘著之處、破開為創、因成下疳者、每多有之、又觀其溺道臭膿、糜爛陰莖馬口、遂成下疳者、比比皆然、可以見其同病益明矣。故吾門斷然以此為瘡內下疳者、為是也。

〔時還讀我書 下〕先教諭ノ言ニ、今ノ淋ハ多ハ微毒ヨリ來リテ古ノ淋ト同ジカラズ、瘡瘍經驗全書ニ内注疳ト名ケテ、小柴胡加龍膽車前子ヲ用タリ、證治要訣ニ小便注、桿甘瘡トイヘルアリ、亦毒淋ナランカ、袖珍方ニ、蛙桿瘡一名下疳瘡トアリ、コレハシカト下疳ノコトナリ、

淋瀝

〔倭名類聚抄 三〕臨瀝 病源論云、臨瀝音歴之太、小便滴瀝也、

〔箋注倭名類聚抄 二〕下總本注首有下字、醫心方淋瀝遺尿同訓、新撰字鏡、麻訓志太々留所引文原書無載、恐源君誤引、按、臨瀝當作淋瀝、病源候論諸淋候云、腎虛則小便數、膀胱熱則水下澀、數而且澀、則淋瀝不宣、故謂之為淋、

〔萬安方 三十一〕婦人淋瀝日本呼淋曰消渴即世俗之誤也消渴則內消飲水之名也滑數咽乾曰消渴淋痛間誤曰淋病也、

夫婦人淋者、由腎虛向膀胱熱也、膀胱與腎為表裏、但主於水行、於脬者為小便也、藏府不調為邪所乘、腎虛則小便數、膀胱熱、則小便澀、其狀小便疼痛澀數淋瀝不宣、故謂之淋也、

〔醫心方 十二〕治遺尿方第廿三

病源論云、遺尿者此由膀胱虛冷、不能約於水故也、范汪方治人遺尿方カフル求俱反救也之言揭也、

〔筆のすさび 三〕一大食會 一つのころか、備後福山に、大食會といふことをはじめしものあり、其