

凡稱蟲者、唯蝨蟲最居多、其生也必直出、如小兒每然、蓋小兒元氣猶未十分強壯、故飽食、則元氣專奔命於胃中、而腸間元氣微怠、慢而鬱滯、已鬱滯而蒸熱、則蟲乃直生而下出矣、若水穀速入腸中、充滿則元氣專奔命於腸間、而胃中之氣微怠、慢而鬱滯、已鬱滯而蒸熱、則蟲乃隨生而吐出矣、腸胃上下、蟲之生出、其化機俱同、此止蟲之生出、而其後無何患害、略中如此者、或腹痛如刺如撞、或胸痛脇痛、或乾嘔、或吐食吐痰、或惡心嗜雜、或吐酸水、或噫錯氣、或頻乾噫、或目眩頭重、或腹鳴雷沸、或背痛腰重、或腿股重痛、或泄或秘、或放屁惡臭、或腹脹似鼓脹狀、或小腹冤熱、或兩眇脹悶、或背微惡寒、或蒸々微熱、或口涌清水、或頻吐唾、或鼻聞異臭、或惡粳飯、或他物、或偏嗜一物、或喫生米、茶葉、浮炭、壁土、或喫燒土、俗所謂土餅、呼爲葛窠、刺傑者、或喫手爪、甲、種々證候、不可盡述、又有奇怪不可名狀、尋常至希、所不見聞之疾、多是蟲證、且此證與癩相爲影響、故世醫呼小兒疾、多爲蟲證者、若非癩、則必是癩、而蟲亦間有之、其證或蒸々微熱、有癢、有瘡、有癩、有蟲、或性急多怒、多癩、或軀啼號哭、多癩、或食後懶倦、長座不立、或蟲、或目眵赤爛、鼻下赤爛、涎流、頤赤爛、多蟲、或腹脹體瘦、癩、有瘡、有蟲、有疥、等是也、若槩謂之蟲證者、非也、須審察詳辨、施設救療之方法、慎勿誤矣、

〔內科秘錄九〕蟲病

蟲ハ人身中ニ生ズル所ノ蟲ニシテ、蠅、寸、白、蠅、蠅ノ三種ヲ古ヨリ三蟲ト稱シ、和漢及ビ和蘭トモニ説キ、人々ノ常ニ知ル所ナリ、蠅蟲ハ最モ多ク、蠅蟲ハ之レニ次ギ、寸白蟲ハ希有ナリ、病源候論ニ九蟲ヲ辨ジ、千金方ニ五臟ノ蟲ヲ説キ、十藥神書ニ勞瘵ノ蟲ヲ載スルニ至ツテハ、半バ妄誕ニシテ實驗ノ事ニ非ズ、

〔病名彙解二〕虫痛チウツウ 心痛九種ノ一ツナリ、唇紅ニ面ニ白筋生ジ、蛔ヲ生ジ、心胸痛テ當ガタク、痛定レバ能食ス、飢ルトキハ沫ヲ嘔ス、

〔康富記〕寶德三年十二月十一日乙亥、外記三臍康純爲分配之處、兩三日虫腹更發、平臥候間、不及召