

長血  
白血

婦人月水不調ト云ハ、或ハトク來テ止ラズ、或遅ク來テ滯ル也、治方、桂心酒ニ摺飲ヨ、

〔倭名類聚抄<sup>三</sup>〕長血 小品方云、婦人長血奈賀 又有白血、

〔箋注倭名類聚抄<sup>二</sup>〕小品方十二卷、陳延之撰、見隋書唐書、今無傳本、按長血白血之名、於諸醫書未

見、蓋長血即崩漏、白血即帶下也、

〔伊呂波字類抄<sup>病奈瘡</sup>〕長血ナカチ 〔同<sup>病志</sup>瘡〕白血シラチ

〔五體身分集<sup>下</sup>〕開陰病分崩漏本方ニ此等ノ病ヲバ、崩中、崩血トテ三種ヲ注リ、

婦人ノ長血ハ玉水風ト云病也、此レ九種ノ下腹ノ内也、治方、書墨搗羅湯ニ入テ服ヨ、酢ニ摺テモ  
毎日服ヨ、

〔瘍科秘錄<sup>八</sup>〕帶下

帶下ハ素問ニ見ユ、金匱ニモ出テ、治法ヲ載セタリ、婦人良方云、人有帶脈、橫於腰間、如束帶之狀、病  
生於此、故名爲帶、ト云フ說ナレドモ、強解ノヤウニ思フナリ、帶ハ滯ノ義ニテ、穢物淤滯シテ下ル  
意ナリ、痢ノコトヲモ滯下ト云フユヘ、水ヲ去テ混淆セヌヤウニシタルモノナルベシ、後世ニ及  
テ、赤白ノ二症ヲ分ツ、本邦ニテ、赤帶ヲナガチト云、白帶ヲシラチト云フ、至極ノ大病ニテ、先必死  
ト定メテヨキ程ノ者ナリ、老媼ノミ患ヘテ壯婦ニ無シ、多クハ五六十歳ニテ發ス、稀ニ早ク發ス  
ル者モ、四十歳以上ナリ、壯婦ノ帶下ヲ患フルト云フハ、多クハ月信クイスイノ不調ニテ、眞ノ帶下ニ非ズ、  
老媼ノ月信一旦斷テ后、惡露クダリモノ適下ルコト、月信ノ如ク、自分モ月信ノ誤テ復來リタルモノナラン  
ト、輕ク心得テ居ルウチニ、期日ヲ過レドモ止マズ、愈多ク下リ、少腹絞痛シ、或崩漏シテ、一次ニ一  
升餘モ下リ、或ハ雞肝ノ如キ凝血ヲ下シ、血ノ濃モノハ紫黑色、薄キモノハ桃花色ニテ、鮮紅ナラ  
ズ、多ク下リタル後ハ、下リ物減少スレドモ、又腹痛シテ大ニ崩下スルコト前日ノ如ク、幾度モ漏  
下スルコト、數月ヲ經レドモ止マズ、遂ニ白穢物ヲ下スニ至ル、續テ白穢物ノミ下ルモノモアレ