

セリ、其名チリケ、チリチリケ、紅チリケ、黃チリケ、波美チリケ、其論疳ヲサスニ非ズ、胎毒ヲ指ス、又梶原性全ノ頓醫抄ニ、塵氣ニ作ル、經穴彙解身柱ノ條ニ、諸ヲ引テ具論セリ、見ルベシ、今ノ疳ト云モノ、適當ノコトハ、宋錢仲陽ノ小兒直訣ニ、五藏ノ疳ヲ載テ論タルモノ詳也、古ハ疳トハ唱ヘザルコト、見ユルナリ、素靈ニ疳ノ字ナク、千金方ニモ疳ノ字ナシ、中略食ヲ進ンデ腹ハ大クテ、外ノ處ハ瘦ル、丁奚病ト云、氣厥論ニ大腸移熱於胃、喜食而瘦入按、衍字、甲乙作又、謂之食亦、胃移熱於胆、亦曰食亦トアリ、小兒ノコトニハアラテドモ食亦ト云ベシヤ、

〔保嬰須知〕疳疾

小兒疳疾者蓋古所謂傷飽哺露、丁奚、穀瘵等是也、其爲證也、毛髮焦稀、或生瘡痂、或髮作穗、或四肢沈重、身體苦熱、面黃腹大、頭小黃瘦、或吐脹腸鳴、眼目生翳、或白膜遮睛、或鼻下赤爛、揉鼻擗目、或頤唇赤色、又好咬指甲、或肚大青筋、四肢柴瘦、背脊胸肋骨立羸露、或身熱作渴、時又腹痛、或吐涎、嘔逆、乳食不化、或大便青黃如菜花色、或瀉下酸臭、下痢白膿、又有下赤白膿血者、外臺秘要謂之疳痢、又瀉下鮮血、或小便不調、時出白津、或小便渾濁、澄汰之則如米泔、或玉莖陰囊、舉丸腫脹、或身發瘡疥、而不堪瘙癢、或兩腋生結核、不堪疼痛、或欬嗽寒熱、皮膚皺錯、至其變態、則好啖桴炭生米、壁土瓜果酸鹹辛辣等之物、或自嚙爪、或好飲酒、或惡甜物、而反好苦味、又有養食、食已仍不知飽足、又不生肌肉、肚腹脹大、大便數而多泄者、巢氏病源呼爲豁治、又涎唾流出、漬於頤下、稱之滯頤、又眼無障翳、而不見物、名管盲、又晝晴明、晚則不見物、謂之雀目、後世又稱鷄盲、其他赤爛生瘡、瘡後還發成疹、謂之胎赤、又有肛門糜爛、浸淫不愈者、後世謂之獼猴疳、古所謂疳蠱也、至變之又變、則有四五歲而智慧技巧、勝於大人、或能作字、猶老成人者、余○片倉周以爲此亦疳之候、豈足深稱譽、又有四五歲而尙不能言、又不能起者、謂之語遲、行遲、此雖由先天不足、亦有屬疳所因者、不可不審焉、以上證狀、雖有百端、是皆疳之候也、

〔病名彙解〕二疳鼻レ 小兒疳病ノ種類ナリ、病源ニ云、鼻ノ下兩邊赤ク發スルトキ、微ク瘡アツテ痒

醫鼻