

光生按ズルニ、榅桲ハ番名マロメロト云テ、模櫧ノ一類ナリ。

〔書言字考節用集六生植〕山楂ヤマザシ時珍云、樹高數尺、葉有赤黃二色、肥者如小林檎、實山楂

〔和漢三才圖會八十七〕山楂子 赤瓜子 鼠楂 山裏果 猴楂 棠様子 茅楂 杞子 羊棟

## 繫梅

本綱山楂子生山中、而味似楂子、故名之。世俗作山楂者誤矣。查<sub>音</sub>乃水中浮木與楂字何關、有二種而功相同。

一種小者、樹高數尺、葉有五尖、極間有刺、三月開五出小白花、實有赤黃二色、肥者如小林檎、小者如指頭、九月熟、小兒采而賣之、閩人取熟者去皮核搗和糖蜜作爲楂糕、以充果物、其核狀如牽牛子、黑色甚堅、

一種大者、樹高丈餘、花葉皆同、但實稍大、而色黃綠、皮濶肉虛爲異爾、初甚酸澀、經霜乃可食、氣味酸冷、消食積、補脾、治小腸疝氣產後兒枕痛、

唐本草雖有赤瓜、後人不知卽此也。自朱丹溪始著山楂之功、而後遂爲要藥、能尅化飲食、若胃中無食積、脾虛不能運化、不思食者多服之、則反尅伐脾胃也。煮老雞硬肉入山楂子數顆、卽易爛、則消肉積之功可推、

〔重修本草綱目啓蒙二十一〕山楂 サンザシ 通名 閏月ムメハ 呼バズ 一名山果子 正傳醫學 山栗

紅果 今古醫統 山栗果 同上 猴梨保赤 全書 栲楂子 百一方 糖楂兒 同上 糖楂子 本草蒙筌 映山紅果 救荒

本草棠子 本經逢原 地乙梨 月令採取 山棠棣 附方

小木ニシテ高サ四五尺叢生ス、枝又多ク繁リテ刺アリ、春新葉ヲ互生ス、長サ一寸許、五岐七岐ニシテ鋸齒アリ、枝梢ニ白花簇生ス、梅花ノ形ニ似テ瓣皆上ニ向フ、後實ヲ結ブ、形林檎ニ似テ大サ六七分許、秋ニ至リ熟シテ赤シ、又黃色ナル者アリ、内ニ核アリ、牽牛子ノ如シ、藥ニハ核ヲ去リ肉