按酢漿草和訓加太波美、俗云須伊モ乃久佐、處處多有之、繁衍如蔓、葉色紫或綠、小兒採之和鹽裹于籜吸汁、又接其葉琢眞鍮色黯者則如新、然淡白失本色、但用綿實殼灰琢、則本色不變鮮明、

〔重修本草綱目啓蒙十六〕酢漿草　カタバミ　カタバミグサ　スイモグサ　スイモノグサ　尾州　スイグサ　雲州　スグサ　江戸　スカンコ　津輕　スカスカ　南部　ハスグサ　相州　コガ子パナ　筑前　コガ子グサ　肥前、讃州、カンガミグサ　防州　カバミグサ　石州　カマクサ　播州　タマクサ　同上　スバメノハカマ　仙臺　トンボグサ　江州　トンボノキウリ　加州　スモヽ　泉州　三谷

六葉草俗名　一名醋啾啾附方　三葉酸漿草　酸草　醋草　雀兒草共同上　歲寒漿八閩通志　鵝鴿飯醫學六要　布谷飯　酸梅草共同上　鷓鴣飯證治大還　酸車草醫學入門　鳩漿草證治準繩　鹹酸草閩書　酸齏草古今秘苑　蟠螅青茹草編

庭間ニ多ク生ズ、小草ナリ、地ニ蔓延シ、葉五生ス、形三瓣、瓣ゴトニ一缺アリテ、カタバミノ紋ト呼ブ狀ニ同ジ、大サ三五分、肥地ニアル者ハ大サ一寸許、蔓モ亦長シ、二三月花ヲ開ク、黃色五瓣、大サ三分許、他時ニモ亦花アリ、野州中禪寺ニハ粉紅色ナルモノアリ、花後圓角ヲ結ブ長サ四五分、熟スレバ自ラ裂ケテ內子飛出ス、其子小ニシテ白色落テ苗ヲ生ズ、一種葉色紅紫ナル者ハ赤孫施ナリ、花中ニ紅色アリ、アカカタバミト云フ、一種エイザンカタバミト呼ブアリ、葉大ニシテ一寸餘、肥タルモノ二寸餘、葉末ニ尖リアリ、春花ヲ開ク、白花大サ七八分、又淡紅色ナル者アリ、花後新葉ヲ生ズ、根上一寸許鱗甲ヲナス淡紅色、コレ舊葉ノ蒂ノ殘レルナリ、〇中略

增、天保十四癸卯年蠻舶大葉ノ酸漿草ヲ齎來ス、蠻名オギサトリスローザト呼ブ、七月舊根ヨリ苗ヲ生ズ、高サ七八寸許、一根十餘葉叢生ス、三葉一蒂ニシテ淡綠色形エイザンカタバミノ葉ニ似テ、葉頭ニ微シク凹ミアリ、一葉ノ大サ徑二寸餘ニ及ブ、八月ニ至テ葉中莖ヲ抽ズルコト七八寸餘、莖頂ニ細枝七八條ヲ四方ニ分チ、一層ヲナシ、枝ノ末ゴトニ二寸餘ノ細蒂ヲ生ジ、蕾ヲ綴ル