

分二三小枝、二三月開細紫花、結實如豆大、一顆三粒相合、生青熟黑中有白仁、如續隨子之狀、今人往往皆呼其根爲狼毒誤矣、狼毒葉似商陸、大黃輩無漿汁、此物大戟甘遂ニ似テ、莖葉肥大、根形商陸根ノゴトクニシテ、黃赤色、斷之汁出藤黃色ノゴトシ、其餘皆東壁ガ説ノゴトシ、和産ナシ、漢種享保中種ヲ傳テ、今官園ニアリ、此物漢土ヨリ渡ス時狼毒ト稱ス、漢人誤來ルコト久シ、

草蔞茹 一名白蔞茹、東都方言ヤブツバ、陶弘景曰、次出近道名草蔞茹、色白、蘇頌曰、又有一種草蔞茹色白ト、此物所在濕地ニ生ズ、狀大戟甘遂ニ似テ、大ナリ、春末黃花ヲ開ク、根蔞茹ニ似テ、小ニシテ色白シ、

〔重修本草綱目啓蒙^{十三}〕毒草蔞茹 チアザミ和名 ニヒマグサ 同上 一名吾獨毒 只 本藥

蔞茹ニ草蔞茹、漆頭蔞茹ノ二種アリ、草蔞茹ハサハウルシ同上、城ノウルシ同上、伏見ハカノチ、狐ノチ、ナベワリ同上、共ニチグサ江チテウサウ州信ナベナグリ越、此草河邊湖澤傍ニ多ク、地ニ滿テ生ズ、城州伏見、淀宇治邊ニ最モ多シ、春早ク宿根ヨリ芽ヲ叢生ス、淡紅色、長ズレバ圓莖、高サ二三尺ニ至ル、葉ハ金絲桃葉ヒヨウチヂニ似テ、狭ク微毛アリ、數多ク互生ス、莖葉ヲ切レバ白汁出ツ、莖梢ニ五葉對生ス、ソノ上ニ五枝ヲ分チ出ス、各二三寸此レニ附ク、葉ハ狀チ短ク尖リテ、脚葉ノ形ト異ナリ、枝端ゴトニ四葉對生ス、三月ニ其上ニ小花開ク、四瓣淡紫黃色、花中ヨリ細莖ヲ出シ、實ヲ結ブ、續隨子ニ似テ、チイサク、僅ニ一分餘、皮ニ疙瘩アリ、中ニ子三粒アリ、花下ノ四葉黃色ニ變ジ、遠ク望メバ花ノ如シ、四月ニ苗枯ル、根ハ年ヲ經テ枯レズ、形チ肥長ニシテ叢生ス、大ナルモノ徑一寸許リ、皮白色、微黃ヲ帶ブ、此ヲ切レバ白汁出ツ、漆頭蔞茹ハ和産ナシ、生根享保年中ニ唐山ヨリ來ル、ソノ時ハ狼毒ト名ケテ渡ス、唐山ニテ蔞茹ヲ誤リテ狼毒ト呼ブコト、集解時珍説ニ辨ゼリ、冬ノ末春ノ初宿根ヨリ芽ヲ叢生ス、其色紅紫觀ツベシ、二三月ニハ圓莖、高サ一尺餘、葉互生シテ密ナリ、微シク毛アリ、莖葉ヲ切レバ白汁出ツ、莖梢ニ一所ヨリ五枝ヲ對シ出シ、五方ニ分ル、ソノ葉及花實ノ形